

ŽLTAČKA "A"

AKO SA CHRÁNIŤ PRED OCHORENÍM



Hepatitída (žltačka) typu A je nákažlivé ochorenie spôsobené vírusom, ktoré poškodzuje pečeň. Zdrojom infekcie sú osoby s príznakovou alebo bezpríznakovou formou ochorenia. Liečba tohto ochorenia môže trvať týždne až mesiace. Ochoreniu dokážeme predísť očkováním proti žltačke typu A.

AKO SA ŠÍRI ŽLTAČKA TYPU A ?



Neumytými rukami po vyprázdňovaní či použití toalety



Pitím tekutín a jedením potravín, na ktoré sa dostal vírus žltačky



Úzkym kontaktom (vrátane sexu) s nakazeným



Delením sa o osobné predmety, pitím z jednej fľaše, spoločnou cigaretou

AKO SA VIETE CHRÁNIŤ PRED ŽLTAČKOU?



Dajte sa zaočkovať proti žltačke typu A, po očkovaní by ste mali byť celoživotne chránení pred ochorením



Vždy si poriadne umývajte ruky, hlavne po toalete a pred jedlom

AKO SPOZNÁTE OCHORENIE NA ŽLTAČKU A



Únava, horúčka



Žlté sfarbenie pokožky alebo očí



Nechuť do jedla, nevoľnosť, bolest brucha alebo vracanie



Tmavý moč, svetlá stolica alebo hnačka

Prvé príznaky ochorenia sa môžu objaviť až mesiac po tom, čo sa človek infikoval vírusom spôsobujúcim žltačku A. U väčšiny detí býva infekcia bez viditeľných príznakov a ochorenie sa zistí až u dospelých, ktorí sa medzičasom tiež infikovali. **Prenos infekcie je možný už aj v období pred príznakmi ochorenia, preto je veľmi dôležité neustále dbať na čistotu svojich rúk.**